

Obavijest maslinarima

12.03.2025. Splitsko-dalmatinska županija

Na većini lokaliteta u tijeku jerezidba maslinika. Maslina je na hladnijim položajima u fenofazi mirovanje do početak vegetacije (BBCH 00-01), a na toplijim u fenofazi otvaranje cvatnih pupova (BBCH 53).

Uvjeti za zarazu **paunovim okom** (količina oborina i temperatura) su ostvareni.

Iako se pojava bolesti i štetnika razlikuje prema položaju, sortimentu i prethodnim provedenim agrotehničkim zahvatima u ovom periodu zajedničko svim maslinicima je važnost provedbe **preventivne** mjere zaštite od **uzročnika paunovog oka**. Prije odabira sredstva za zaštitu obavezno napravite procjenu zarazom - vidljivi simptomi ili test latentne zaraze. U slučaju jače zaraze prednost dajte **sistemičnim fungicidima** ili **biološkom fungicidu** opisanim u tablici niže. Time se izbjegava odbacivanje listova koja se događa kada se koriste bakrena sredstva na zaraženim listovima, tzv. **“bakreni šok”**.

U praksi su najbolji rezultati postignuti u maslinicima koji su provodili zaštitu parcijalno, tj. **masline koje se oreže taj dan se i tretiraju**.

Tijekom rezidbe potrebno je:

ŠTETNI ORGANIZAM	PROCJENA STANJA / PREPORUKE
PAUNOVO OKO (<i>Spilocaea oleagina</i>)	Nakon završene rezidbe preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra: NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG, CUPRA, CODIMUR 50, COPPER KEY FLOW, AIRONE SC, NORDOX 75 WG i dr. Ukoliko su na listovima već vidljivi simptomi zaraze ili se maslinici nalaze u udolinama, terenima sa slabom cirkulacijom zraka prednost dajte sistemičnim fungicidima: NATIVO 75 WG, ORTIVA TOP, STROBY,

	SUGOBY, QUIMERA, DECIBEL MAX i dr. U ekološkim maslinicima s utvrđenom jačom zarazom preporučujemo sredstvo SERENADE ASO – biološki fungicid – važno je ponavljanje tretmana za svo vrijeme povoljnih uvjeta za infekciju (najviše 6 puta godišnje, od 5 lista do berbe).
BAKTERIJSKI RAK MASLINE (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>savastanoi</i>)	Izbjegavati rezidbu po vlažnom vremenu; dezinficirati alat prije rezidbe (70 % alkoholom); zaražena stabla u nasadu zadnja rezati; tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene izboje; neposredno nakon rezidbe obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra ili biološki baktericid i fungicid SERENADE ASO(<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> soj QST 713).
ŠTITASTE UŠI	tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene grančice. *ukoliko se radi o štitastoj uši araukarije(područje Sutivana, Supetra i Miraca na otoku Braču) odstranjene grane uništiti kompostiranjem, zakopavanjem.
ČAĐAVICA	tijekom rezidbe uklanjati jače zahvaćene grane; nakon rezidbe primjena jednog od pripravka na osnovi bakra ili sumpora.
GRANOTOČ (<i>Zeuzera pyrina</i>)	tijekom rezidbe ukloniti napadnute grane
POTKORNJACI	ukloniti napadnute izboje; preporučamo ostavljanje u nasadu pogodnih

	lovnih grana koje se trebaju iznijeti iz maslinika najkasnije do kraja travnja
--	---

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom <http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>.

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Tihana Pipinić dipl.ing. agr.

Lea Puharić Visković dipl. ing.agr

Mob: 0914882932